		SVR naieve geen cirrose	SVR naieve met cirrose	SVR treatment experienced geen cirrose	SVR treatment experienced met cirrose
Genotype 1	**IFN eligible: SOF + PEG/RBV x 12 wkn** (overweeg 24 weken behandeling bij cirrose en eerdere non-respons)	89% [a] (261/292) gt1a 92% (206/225) gt1b 82% (54/66) (cirrose en niet cirrose samen)	80% [a] (43/54) niet uitgesplitst per subtype	geen data SVR wordt geschat op 71%-78% [b]	geen data SVR wordt geschat op 71%-78% [b]
	IFN ineligible: SOF + RBV x 24 wkn	75%(87/114) studie in HIV/HCV[c] gt1b 54% (13/24) gt1a 82% (74/90)	geen data	geen data	geen data
	SOF + SMV ± RBV x 12 wkn *	geen data	94% (16/17)[d] armen +/- RBV en 12/24 weken Rx samengenomen	96% (26/27 arm + RBV)[d] 93% (13/14 arm - RBV) 89% (24/27) in patienten met Q80K mutatie	96% (21/22)[d] armen +/- RBV en 12/24 weken Rx samengenomen
	falen op PEG/RBV/proteaseremmer				
	SOF + PEG/RBV x 12 wkn (overweeg 24 weken bij cirrose en/of eerdere non-respons)			geen data	geen data
	IFN ineligible: SOF + RBV x 24 Wkn			geen data	geen data